

にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=1	9,640	5,770	6,750	803	87.1	0.9	0.3	0.7	7.9	3.1	44	24.7	417
2	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=2	9,450	5,320	6,790	788	88.4	0.8	0.2	0.7	6.8	3.1	38	25.3	497
3	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=3	9,560	5,340	6,890	797	88.4	0.8	0.3	0.7	6.8	3.0	39	19.3	516
4	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=4	10,100	6,060	7,040	842	87.9	0.9	0.3	0.7	7.0	3.2	41	18.8	433
5	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=5	7,480	4,270	5,340	623	89.0	0.8	0.3	0.7	6.3	2.9	37	21.3	500
6	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=6	12,500	7,300	8,890	1,040	86.7	0.9	0.3	0.7	8.0	3.4	45	16.6	485
7	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=7	8,760	4,400	6,560	730	88.1	0.8	0.3	0.7	7.1	3.0	40	17.8	478
8	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=8	7,490	4,420	5,280	624	89.7	0.8	0.2	0.7	5.6	3.0	33	14.1	430
9	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=9	10,000	5,760	7,150	833	88.0	0.9	0.3	0.8	6.8	3.2	40	14.2	542
10	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第1回目 n=10	9,130	5,340	6,460	761	88.5	0.9	0.3	0.7	6.5	3.1	39	20.1	476
	平均値	9,411	5,398	6,715	784	88.2	0.9	0.3	0.7	6.9	3.1	40	19.2	477
	標準偏差	1428.3	916.7	1005.6	118.7	0.9	0.05	0.04	0.03	0.71	0.14	3.4	3.8	40.1
	変動係数(CV%)	15.2	17.0	15.0	15.1	1.0	5.9	14.1	4.5	10.2	4.6	8.5	20.0	8.4
	最大値	12,500	7,300	8,890	1,040	89.7	0.9	0.3	0.8	8.0	3.4	45	25.3	542
	最小値	7,480	4,270	5,280	623	86.7	0.8	0.2	0.7	5.6	2.9	33	14.1	417
	最大値-最小値	5,020	3,030	3,610	417	3.0	0.1	0.1	0.1	2.4	0.5	12	11.2	125

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=1	8,750	4,030	6,730	729	-	-	-	-	-	-	-	-	504
2	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=2	8,220	3,810	6,310	685	-	-	-	-	-	-	-	-	527
3	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=3	8,450	4,020	6,440	704	-	-	-	-	-	-	-	-	490
4	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=4	10,900	4,610	8,550	908	-	-	-	-	-	-	-	-	477
5	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=5	7,390	3,410	5,680	616	-	-	-	-	-	-	-	-	449
6	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=6	9,370	4,840	6,950	781	-	-	-	-	-	-	-	-	443
7	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=7	7,980	3,830	6,060	665	-	-	-	-	-	-	-	-	487
8	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=8	7,310	3,750	5,430	609	-	-	-	-	-	-	-	-	476
9	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=9	8,360	3,770	6,470	697	-	-	-	-	-	-	-	-	455
10	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第2回目 n=10	8,540	4,270	6,400	712	-	-	-	-	-	-	-	-	508
	平均値	8,527	4,034	6,502	711	-	-	-	-	-	-	-	-	482
	標準偏差	1032.4	430.6	851.1	86.0	-	-	-	-	-	-	-	-	27.2
	変動係数(CV%)	12.1	10.7	13.1	12.1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6
	最大値	10,900	4,840	8,550	908	-	-	-	-	-	-	-	-	527
	最小値	7,310	3,410	5,430	609	-	-	-	-	-	-	-	-	443
	最大値-最小値	3,590	1,430	3,120	299	-	-	-	-	-	-	-	-	84

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=1	6,810	2,820	5,400	568	-	-	-	-	-	-	-	-	456
2	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=2	7,050	3,220	5,440	588	-	-	-	-	-	-	-	-	457
3	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=3	7,320	3,250	5,690	610	-	-	-	-	-	-	-	-	452
4	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=4	9,020	4,150	6,940	752	-	-	-	-	-	-	-	-	454
5	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=5	7,910	3,410	6,200	659	-	-	-	-	-	-	-	-	465
6	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=6	7,440	3,740	5,570	620	-	-	-	-	-	-	-	-	447
7	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=7	7,810	3,580	6,020	651	-	-	-	-	-	-	-	-	470
8	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=8	9,270	4,790	6,870	773	-	-	-	-	-	-	-	-	475
9	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=9	7,080	3,660	5,250	590	-	-	-	-	-	-	-	-	440
10	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第3回目 n=10	8,410	3,870	6,470	701	-	-	-	-	-	-	-	-	471
	平均値	7,812	3,649	5,985	651	-	-	-	-	-	-	-	-	459
	標準偏差	846.8	548.0	616.1	70.6	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3
	変動係数(CV%)	10.8	15.0	10.3	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5
	最大値	9,270	4,790	6,940	773	-	-	-	-	-	-	-	-	475
	最小値	6,810	2,820	5,250	568	-	-	-	-	-	-	-	-	440
	最大値-最小値	2,460	1,970	1,690	205	-	-	-	-	-	-	-	-	35

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=1	9,270	4,350	7,090	773	-	-	-	-	-	-	-	-	494
2	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=2	9,450	4,990	6,950	788	-	-	-	-	-	-	-	-	517
3	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=3	7,440	3,390	5,740	620	-	-	-	-	-	-	-	-	487
4	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=4	7,250	3,920	5,290	604	-	-	-	-	-	-	-	-	426
5	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=5	8,790	4,760	6,410	733	-	-	-	-	-	-	-	-	463
6	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=6	8,510	4,040	6,490	709	-	-	-	-	-	-	-	-	441
7	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=7	7,960	4,170	5,870	663	-	-	-	-	-	-	-	-	495
8	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=8	7,890	3,830	5,970	658	-	-	-	-	-	-	-	-	524
9	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=9	6,740	3,150	5,160	562	-	-	-	-	-	-	-	-	528
10	にんじん(ア品種・Mサイズ, 土耕栽培, A産地, 露地)第4回目 n=10	8,320	4,410	6,110	693	-	-	-	-	-	-	-	-	505
	平均値	8,162	4,101	6,108	680	-	-	-	-	-	-	-	-	488
	標準偏差	876.7	568.3	640.3	73.2	-	-	-	-	-	-	-	-	34.6
	変動係数(CV%)	10.7	13.9	10.5	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1
	最大値	9,450	4,990	7,090	788	-	-	-	-	-	-	-	-	528
	最小値	6,740	3,150	5,160	562	-	-	-	-	-	-	-	-	426
	最大値-最小値	2,710	1,840	1,930	226	-	-	-	-	-	-	-	-	102

標準偏差は原則として測定値5以下の場合、小数2桁で表示しております。

にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)

根端及び葉柄基部を除いて試験した。

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=1	7,330	2,340	6,160	611	90.1	-	-	-	-	-	-	-	435
2	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=2	6,110	1,910	5,150	509	90.4	-	-	-	-	-	-	-	435
3	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=3	7,040	2,300	5,890	587	90.4	-	-	-	-	-	-	-	430
4	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=4	6,470	1,890	5,520	539	90.4	-	-	-	-	-	-	-	425
5	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=5	8,220	2,600	6,920	685	89.7	-	-	-	-	-	-	-	423
6	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=6	8,690	3,100	7,140	724	89.5	-	-	-	-	-	-	-	445
7	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=7	7,780	2,630	6,460	648	89.4	-	-	-	-	-	-	-	422
8	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=8	7,460	2,490	6,210	622	89.8	-	-	-	-	-	-	-	446
9	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=9	9,340	3,060	7,810	778	89.3	-	-	-	-	-	-	-	452
10	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=10	6,440	2,090	5,390	537	90.6	-	-	-	-	-	-	-	461
	平均値	7,488	2,441	6,265	624	90.0	-	-	-	-	-	-	-	437
	標準偏差	1041.1	424.2	839.2	86.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	13.2
	変動係数(CV%)	13.9	17.4	13.4	13.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	3.0
	最大値	9,340	3,100	7,810	778	90.6	-	-	-	-	-	-	-	461
	最小値	6,110	1,890	5,150	509	89.3	-	-	-	-	-	-	-	422
	最大値-最小値	3,230	1,210	2,660	269	1.3	-	-	-	-	-	-	-	39

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=1	7,430	2,490	6,180	619	89.4	0.6	0.3	0.7	6.3	2.7	36	9.0	432
2	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=2	8,210	2,690	6,860	684	89.4	0.6	0.2	0.8	6.2	2.8	35	9.2	437
3	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=3	6,770	2,050	5,740	564	89.9	0.6	0.1	0.7	6.2	2.5	33	19.3	431
4	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=4	8,070	2,610	6,760	673	89.5	0.8	0.2	0.8	5.9	2.8	34	14.1	444
5	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=5	6,940	2,270	5,800	578	89.9	0.8	0.2	0.8	5.8	2.5	33	11.5	445
6	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=6	7,720	2,140	6,650	643	89.9	0.8	0.1	0.8	5.9	2.5	33	15.4	468
7	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=7	7,600	2,430	6,380	633	90.0	0.6	0.1	0.7	6.1	2.5	33	8.8	442
8	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=8	7,490	2,270	6,350	624	90.2	0.7	0.1	0.7	6.0	2.3	32	15.0	443
9	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=9	6,840	2,560	5,560	570	90.3	0.7	0.2	0.8	5.6	2.4	32	19.3	428
10	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=10	7,350	2,210	6,240	613	90.1	0.8	0.1	0.8	5.6	2.6	32	12.2	452
	平均値	7,442	2,372	6,252	620	89.9	0.7	0.2	0.8	6.0	2.6	33	13.4	442
	標準偏差	490.3	214.7	442.6	40.9	0.3	0.09	0.07	0.05	0.2	0.16	1.3	3.9	11.7
	変動係数(CV%)	6.6	9.1	7.1	6.6	0.4	13.5	35.0	6.5	4.1	6.3	4.1	29.4	2.6
	最大値	8,210	2,690	6,860	684	90.3	0.8	0.3	0.8	6.3	2.8	36	19.3	468
	最小値	6,770	2,050	5,560	564	89.4	0.6	0.1	0.7	5.6	2.3	32	8.8	428
	最大値-最小値	1,440	640	1,300	120	0.9	0.2	0.2	0.1	0.7	0.5	4	10.5	40

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=1	7,140	2,260	6,010	595	90.4	-	-	-	-	-	-	-	545
2	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=2	7,090	1,950	6,110	591	90.0	-	-	-	-	-	-	-	528
3	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=3	9,710	3,270	8,070	809	89.7	-	-	-	-	-	-	-	526
4	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=4	6,730	1,970	5,740	561	90.2	-	-	-	-	-	-	-	486
5	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=5	6,910	2,130	5,840	576	90.5	-	-	-	-	-	-	-	531
6	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=6	7,270	2,520	6,010	606	89.9	-	-	-	-	-	-	-	560
7	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=7	8,660	2,870	7,220	722	89.7	-	-	-	-	-	-	-	534
8	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=8	7,660	2,390	6,460	638	89.8	-	-	-	-	-	-	-	522
9	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=9	7,280	2,500	6,030	607	90.7	-	-	-	-	-	-	-	499
10	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=10	6,590	1,930	5,620	549	90.1	-	-	-	-	-	-	-	521
	平均値	7,504	2,379	6,311	625	90.1	-	-	-	-	-	-	-	525
	標準偏差	967.4	434.4	765.1	80.6	0.3	-	-	-	-	-	-	-	21.0
	変動係数(CV%)	12.9	18.3	12.1	12.9	0.4	-	-	-	-	-	-	-	4.0
	最大値	9,710	3,270	8,070	809	90.7	-	-	-	-	-	-	-	560
	最小値	6,590	1,930	5,620	549	89.7	-	-	-	-	-	-	-	486
	最大値-最小値	3,120	1,340	2,450	260	1.0	-	-	-	-	-	-	-	74

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=1	5,130	1,380	4,440	428	91.2	-	-	-	-	-	-	-	454
2	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=2	6,150	1,930	5,180	513	91.2	-	-	-	-	-	-	-	461
3	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=3	5,880	1,690	5,030	490	91.5	-	-	-	-	-	-	-	469
4	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=4	5,390	1,580	4,600	449	90.7	-	-	-	-	-	-	-	463
5	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=5	5,800	1,650	4,970	483	91.2	-	-	-	-	-	-	-	464
6	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=6	5,440	1,460	4,710	453	91.3	-	-	-	-	-	-	-	475
7	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=7	5,650	1,690	4,800	471	91.0	-	-	-	-	-	-	-	467
8	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=8	5,890	1,950	4,910	491	91.0	-	-	-	-	-	-	-	459
9	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=9	4,860	1,360	4,180	405	91.2	-	-	-	-	-	-	-	461
10	にんじん(ア品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=10	5,500	1,770	4,610	458	91.1	-	-	-	-	-	-	-	481
	平均値	5,569	1,646	4,743	464	91.1	-	-	-	-	-	-	-	465
	標準偏差	386.7	206.5	298.9	32.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	7.9
	変動係数(CV%)	6.9	12.5	6.3	7.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	1.7
	最大値	6,150	1,950	5,180	513	91.5	-	-	-	-	-	-	-	481
	最小値	4,860	1,360	4,180	405	90.7	-	-	-	-	-	-	-	454
	最大値-最小値	1,290	590	1,000	108	0.8	-	-	-	-	-	-	-	27

標準偏差は原則として測定値5以下の場合、小数2桁で表示しております。

にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地) 根端及び葉柄基部を除いて試験した。

n	検体名	β-カロテン	α-カロテン	β-カロテン	レチノール当量	水分	たんぱく質	脂質	灰分	糖質	食物繊維	エネルギー	ナトリウム	3本の重量
		μg/100g	μg/100g	μg/100g	μg/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	kcal/100g	mg/100g	
1	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=1	5,740	1,990	4,740	478	90.6	-	-	-	-	-	-	-	527
2	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=2	5,940	2,070	4,900	495	90.6	-	-	-	-	-	-	-	471
3	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=3	5,530	1,880	4,590	461	90.8	-	-	-	-	-	-	-	536
4	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=4	5,250	1,860	4,320	438	91.2	-	-	-	-	-	-	-	500
5	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=5	5,660	1,900	4,710	472	90.9	-	-	-	-	-	-	-	542
6	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=6	5,740	1,970	4,750	478	90.8	-	-	-	-	-	-	-	476
7	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=7	6,020	2,000	5,020	502	90.8	-	-	-	-	-	-	-	483
8	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=8	5,790	1,840	4,870	483	90.9	-	-	-	-	-	-	-	422
9	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=9	5,690	1,850	4,760	474	90.8	-	-	-	-	-	-	-	483
10	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=10	5,480	1,790	4,580	457	90.7	-	-	-	-	-	-	-	481
	平均値	5,684	1,915	4,724	474	90.8	-	-	-	-	-	-	-	492
	標準偏差	223.7	88.1	195.6	18.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	35.9
	変動係数(CV%)	3.9	4.6	4.1	3.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-	7.3
	最大値	6,020	2,070	5,020	502	91.2	-	-	-	-	-	-	-	542
	最小値	5,250	1,790	4,320	438	90.6	-	-	-	-	-	-	-	422
	最大値-最小値	770	280	700	64	0.6	-	-	-	-	-	-	-	120

n	検体名	β-カロテン	α-カロテン	β-カロテン	レチノール当量	水分	たんぱく質	脂質	灰分	糖質	食物繊維	エネルギー	ナトリウム	3本の重量
		μg/100g	μg/100g	μg/100g	μg/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	kcal/100g	mg/100g	
1	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=1	5,650	1,820	4,740	471	91.5	-	-	-	-	-	-	-	449
2	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=2	5,190	1,840	4,270	433	91.5	-	-	-	-	-	-	-	448
3	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=3	5,360	1,820	4,450	447	91.5	-	-	-	-	-	-	-	452
4	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=4	5,750	1,890	4,800	479	91.4	-	-	-	-	-	-	-	421
5	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=5	5,400	1,810	4,490	450	91.4	-	-	-	-	-	-	-	449
6	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=6	4,900	1,620	4,090	408	91.5	-	-	-	-	-	-	-	439
7	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=7	5,740	1,840	4,820	478	91.2	-	-	-	-	-	-	-	450
8	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=8	6,000	1,950	5,020	500	91.2	-	-	-	-	-	-	-	444
9	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=9	5,600	1,800	4,700	467	91.1	-	-	-	-	-	-	-	460
10	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=10	5,230	1,690	4,380	436	91.5	-	-	-	-	-	-	-	449
	平均値	5,482	1,808	4,576	457	91.4	-	-	-	-	-	-	-	446
	標準偏差	326.3	93.4	286.9	27.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	10.3
	変動係数(CV%)	6.0	5.2	6.3	5.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-	2.3
	最大値	6,000	1,950	5,020	500	91.5	-	-	-	-	-	-	-	460
	最小値	4,900	1,620	4,090	408	91.1	-	-	-	-	-	-	-	421
	最大値-最小値	1,100	330	930	92	0.4	-	-	-	-	-	-	-	39

n	検体名	β-カロテン	α-カロテン	β-カロテン	レチノール当量	水分	たんぱく質	脂質	灰分	糖質	食物繊維	エネルギー	ナトリウム	3本の重量
		μg/100g	μg/100g	μg/100g	μg/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	kcal/100g	mg/100g	
1	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=1	5,670	1,640	4,850	473	91.2	-	-	-	-	-	-	-	478
2	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=2	5,180	1,610	4,370	432	91.1	-	-	-	-	-	-	-	474
3	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=3	5,240	1,580	4,450	437	91.5	-	-	-	-	-	-	-	463
4	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=4	5,720	1,760	4,840	477	90.9	-	-	-	-	-	-	-	474
5	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=5	5,050	1,510	4,290	421	91.6	-	-	-	-	-	-	-	476
6	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=6	5,230	1,640	4,410	436	91.1	-	-	-	-	-	-	-	486
7	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=7	5,390	1,580	4,600	449	91.0	-	-	-	-	-	-	-	478
8	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=8	5,150	1,630	4,330	429	91.2	-	-	-	-	-	-	-	487
9	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=9	5,440	1,570	4,650	453	91.1	-	-	-	-	-	-	-	478
10	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=10	5,460	1,490	4,710	455	90.9	-	-	-	-	-	-	-	475
	平均値	5,353	1,601	4,550	446	91.2	-	-	-	-	-	-	-	477
	標準偏差	222.7	75.8	208.2	18.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	6.7
	変動係数(CV%)	4.2	4.7	4.6	4.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.4
	最大値	5,720	1,760	4,850	477	91.6	-	-	-	-	-	-	-	487
	最小値	5,050	1,490	4,290	421	90.9	-	-	-	-	-	-	-	463
	最大値-最小値	670	270	560	56	0.7	-	-	-	-	-	-	-	24

n	検体名	β-カロテン	α-カロテン	β-カロテン	レチノール当量	水分	たんぱく質	脂質	灰分	糖質	食物繊維	エネルギー	ナトリウム	3本の重量
		μg/100g	μg/100g	μg/100g	μg/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	kcal/100g	mg/100g	
1	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=1	6,520	1,920	5,560	543	91.1	0.7	0.2	0.3	5.4	2.3	31	26.6	483
2	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=2	6,640	1,860	5,710	553	91.5	0.8	0.3	0.4	4.5	2.5	29	25.7	492
3	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=3	7,140	1,860	6,210	595	90.7	0.8	0.2	0.4	5.4	2.5	32	30.0	485
4	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=4	7,080	1,940	6,110	590	91.2	0.7	0.2	0.4	5.2	2.3	30	27.3	494
5	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=5	7,020	1,850	6,090	585	90.8	0.8	0.2	0.4	5.4	2.4	31	25.9	500
6	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=6	6,950	1,990	5,950	579	91.2	0.7	0.2	0.3	5.2	2.4	30	26.6	485
7	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=7	7,010	1,840	6,090	584	91.1	0.8	0.2	0.3	5.1	2.5	30	26.6	486
8	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=8	5,890	1,440	5,170	491	91.5	0.8	0.2	0.3	4.8	2.4	29	31.8	482
9	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=9	6,100	1,580	5,310	508	91.3	0.7	0.2	0.3	5.2	2.3	30	24.7	480
10	にんじん(イ品種・2Mサイズ, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=10	6,250	1,550	5,470	521	91.2	0.6	0.2	0.4	5.1	2.5	30	21.8	488
	平均値	6,660	1,783	5,767	555	91.2	0.7	0.2	0.4	5.1	2.4	30	26.7	488
	標準偏差	451.9	188.3	373.5	37.6	0.3	0.07	0.03	0.05	0.3	0.09	0.9	2.7	6.2
	変動係数(CV%)	6.8	10.6	6.5	6.8	0.3	10.0	15.8	13.2	5.6	3.6	3.1	10.2	1.3
	最大値	7,140	1,990	6,210	595	91.5	0.8	0.3	0.4	5.4	2.5	32	31.8	500
	最小値	5,890	1,440	5,170	491	90.7	0.6	0.2	0.3	4.5	2.3	29	21.8	480
	最大値-最小値	1,250	550	1,040	104	0.8	0.2	0.1	0.1	0.9	0.2	3	10.0	20

標準偏差は原則として測定値5以下の場合、小数2桁で表示しております。

にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地) 根端及び葉柄基部を除いて試験した。

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=1	7.640	3.380	5.950	637	91.1	0.6	0.2	0.6	4.8	2.7	29	20.8	412
2	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=2	6.420	2.780	5.030	535	91.5	0.6	0.2	0.6	4.8	2.3	28	17.1	408
3	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=3	7.690	3.070	6.150	641	91.5	0.7	0.2	0.6	4.5	2.5	28	24.2	434
4	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=4	7.110	2.970	5.620	593	91.0	0.7	0.2	0.6	5.1	2.4	30	21.6	432
5	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=5	6.880	2.670	5.540	573	91.1	0.6	0.2	0.6	5.0	2.5	29	20.5	421
6	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=6	7.580	3.060	6.050	632	90.6	0.7	0.2	0.7	5.0	2.8	30	16.6	422
7	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=7	7.260	3.080	5.720	605	90.7	0.6	0.1	0.6	5.3	2.7	30	25.0	422
8	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=8	7.270	2.770	5.880	606	90.7	0.6	0.2	0.7	5.3	2.5	30	16.4	420
9	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=9	8.200	3.810	6.290	683	90.9	0.7	0.2	0.6	4.9	2.7	30	16.7	428
10	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第1回目 n=10	6.600	2.590	5.300	550	91.7	0.6	0.2	0.6	4.5	2.4	27	20.6	423
	平均値	7.265	3.018	5.753	606	91.1	0.6	0.2	0.6	4.9	2.6	29	20.0	422
	標準偏差	539.9	363.8	391.7	45.0	0.4	0.05	0.03	0.04	0.28	0.16	1.1	3.2	8.0
	変動係数(CV%)	7.4	12.1	6.8	7.4	0.4	8.6	15.8	7.0	5.8	6.3	3.8	15.8	1.9
	最大値	8.200	3.810	6.290	683	91.7	0.7	0.2	0.7	5.3	2.8	30	25.0	434
	最小値	6.420	2.590	5.030	535	90.6	0.6	0.1	0.6	4.5	2.3	27	16.4	408
	最大値-最小値	1.780	1.220	1.260	148	1.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	3	8.6	26

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=1	6.050	2.680	4.710	504	91.1	-	-	-	-	-	-	-	387
2	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=2	5.860	2.590	4.560	488	91.0	-	-	-	-	-	-	-	388
3	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=3	6.210	2.540	4.940	518	90.8	-	-	-	-	-	-	-	384
4	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=4	7.060	2.940	5.590	588	90.7	-	-	-	-	-	-	-	385
5	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=5	7.160	2.920	5.700	597	91.6	-	-	-	-	-	-	-	396
6	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=6	6.310	2.280	5.170	526	90.7	-	-	-	-	-	-	-	388
7	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=7	6.420	2.500	5.170	535	91.2	-	-	-	-	-	-	-	395
8	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=8	7.020	2.820	5.610	585	90.6	-	-	-	-	-	-	-	394
9	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=9	6.300	2.950	4.820	525	91.0	-	-	-	-	-	-	-	400
10	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第2回目 n=10	6.260	2.660	4.930	522	90.8	-	-	-	-	-	-	-	389
	平均値	6.465	2.688	5.120	539	91.0	-	-	-	-	-	-	-	391
	標準偏差	452.6	220.5	400.4	37.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.3
	変動係数(CV%)	7.0	8.2	7.8	7.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.4
	最大値	7.160	2.950	5.700	597	91.6	-	-	-	-	-	-	-	400
	最小値	5.860	2.280	4.560	488	90.6	-	-	-	-	-	-	-	384
	最大値-最小値	1.300	670	1.140	109	1.0	-	-	-	-	-	-	-	16

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=1	6.030	2.280	4.890	503	90.0	-	-	-	-	-	-	-	407
2	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=2	7.130	3.180	5.540	594	90.4	-	-	-	-	-	-	-	400
3	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=3	5.760	2.530	4.490	480	90.7	-	-	-	-	-	-	-	407
4	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=4	7.130	2.630	5.810	594	89.8	-	-	-	-	-	-	-	418
5	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=5	5.890	2.130	4.820	491	90.4	-	-	-	-	-	-	-	409
6	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=6	5.390	2.070	4.350	449	90.6	-	-	-	-	-	-	-	411
7	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=7	7.020	3.070	5.480	585	90.2	-	-	-	-	-	-	-	421
8	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=8	5.780	2.400	4.580	482	90.2	-	-	-	-	-	-	-	413
9	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=9	7.400	2.510	6.140	617	89.4	-	-	-	-	-	-	-	414
10	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第3回目 n=10	6.740	2.520	5.480	562	90.1	-	-	-	-	-	-	-	407
	平均値	6.427	2.532	5.158	536	90.2	-	-	-	-	-	-	-	411
	標準偏差	728.0	361.4	611.2	60.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	6.1
	変動係数(CV%)	11.3	14.3	11.8	11.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.5
	最大値	7.400	3.180	6.140	617	90.7	-	-	-	-	-	-	-	421
	最小値	5.390	2.070	4.350	449	89.4	-	-	-	-	-	-	-	400
	最大値-最小値	2.010	1.110	1.790	168	1.3	-	-	-	-	-	-	-	21

n	検体名	β-カロテン 当量 μg/100g	α-カロテン μg/100g	β-カロテン μg/100g	レチノール当 量 μg/100g	水分 g/100g	たんぱく 質 g/100g	脂質 g/100g	灰分 g/100g	糖質 g/100g	食物繊維 g/100g	エネルギー kcal/100g	ナトリウム mg/100g	3本の重 量 g
1	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=1	6.870	3.040	5.350	573	90.8	-	-	-	-	-	-	-	401
2	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=2	6.050	2.600	4.750	504	90.7	-	-	-	-	-	-	-	411
3	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=3	6.760	2.860	5.330	563	90.6	-	-	-	-	-	-	-	406
4	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=4	7.120	3.360	5.440	593	90.8	-	-	-	-	-	-	-	415
5	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=5	6.300	2.810	4.890	525	91.0	-	-	-	-	-	-	-	401
6	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=6	6.080	2.430	4.860	507	90.9	-	-	-	-	-	-	-	406
7	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=7	6.070	2.540	4.800	506	91.1	-	-	-	-	-	-	-	435
8	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=8	6.620	2.800	5.220	552	90.5	-	-	-	-	-	-	-	421
9	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=9	6.350	2.810	4.940	529	90.6	-	-	-	-	-	-	-	398
10	にんじん(工品種, 土耕栽培, B産地, 露地)第4回目 n=10	6.190	2.740	4.820	516	90.4	-	-	-	-	-	-	-	421
	平均値	6.441	2.799	5.040	537	90.7	-	-	-	-	-	-	-	412
	標準偏差	378.7	263.1	264.1	31.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	11.6
	変動係数(CV%)	5.9	9.4	5.2	5.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-	2.8
	最大値	7.120	3.360	5.440	593	91.1	-	-	-	-	-	-	-	435
	最小値	6.050	2.430	4.750	504	90.4	-	-	-	-	-	-	-	398
	最大値-最小値	1.070	930	690	89	0.7	-	-	-	-	-	-	-	37

標準偏差は原則として測定値5以下の場合, 小数2桁で表示しております。

